




Soutien cardiaque - Mobilité facilitée

Aliment complet diététique pour chiens à objectifs nutritionnels particuliers "Soutien de la fonction cardiaque en cas d'insuffisance cardiaque chronique". "Récupération nutritionnelle, convalescence". Cet aliment convient également en tant que "Soutien de la fonction dermique en cas de dermatose et de dépilation".



Harpagophytum, vergerette du Canada, reine des prés, cassis, bambou, ortie associés à une haute teneur en EPA (huile de poisson) et à du collagène hydrolysé pour l'intégrité ostéo-articulaire et une mobilité facilitée.

12 kg

24.120

2 kg

24.020



11,5 mm



Ingrédients : Protéines animales déshydratées (24% mini) (canard mini 4%, poulet, dinde, porc). Maïs. Graines de lin. Tapioca. Riz. Graisse de canard. Fibres de pomme. Patate douce. Hydrolysats de protéines animales. Autolysats de poissons (1,5%). Argile. Huile de poisson. Levure de bière. Sulfate de calcium. Fructo-oligosaccharides. Carbonate de calcium. Méthionine. Peptides marins (collagène hydrolysé de type II). Harpagophytum. Artichaut. Bambou. Combretum. Boldo. Curcuma. Romarin. Charbon végétal. Vergerette du Canada. Reine des prés. Ortie. Cassis. Glucosamine sulfate. Chondroïtine sulfate. Taurine. Extraits de romarin. Vitamines et oligo-éléments.

Ingrédients sélectionnés hyperdigestibles : protéines déshydratées de canard, tapioca, riz, patate douce. Sources d'oméga 3 : graines de lin, huile de poisson. Densité énergétique élevée (4103 kcal/kg), concentrations élevées de nutriments essentiels et ingrédients très digestibles. Teneur élevée en acide linoléique (2,36%) ainsi qu'en acide eicosapentaénoïque (EPA) et en acide docosahexaénoïque (DHA) additionnés : somme EPA + DHA = 0,28%.

Soutien cardiaque - Mobilité facilitée

Servir la nourriture progressivement lors de la transition de la nourriture précédente de l'animal, directement du sac ou réhydraté selon le tableau de rationnement imprimé sur le sac. Les quantités journalières doivent être adaptées à la race, au poids et l'activité de l'animal. Fournir suffisamment d'eau potable. Pour obtenir les meilleurs résultats, assurez-vous que les quantités quotidiennes recommandées sont respectées et que l'animal ne reçoit aucun autre aliment. Il est recommandé de demander l'avis d'un vétérinaire avant utilisation ou avant de prolonger la durée d'utilisation.

Durée recommandée (en cas d'insuffisance cardiaque chronique) : Initialement jusqu'à 6 mois.
Durée recommandée (en cas de récupération nutritionnelle, récupération) : Jusqu'à ce que la récupération soit atteinte.

Précautions de stockage : Pour maintenir la qualité des aliments, conservez-les dans un endroit frais, sombre et sec.

NORMAL ACTIVITY

Optimal weight of dog	2 kg	5 kg	10 kg	15 kg	20 kg	25 kg	30 kg	40 kg	50 kg	60 kg	70 kg	80 kg
Daily quantity	42 g	83 g	139 g	189 g	234 g	277 g	318 g	394 g	466 g	534 g	600 g	663 g
Average duration in days (2 kg bags)	48	24	14	11	9	7	6	5	4	4	3	3
Average duration in days (12 kg bags)	286	145	86	63	51	43	38	30	26	22	20	18

MODERATE ACTIVITY

Optimal weight of dog	2 kg	5 kg	10 kg	15 kg	20 kg	25 kg	30 kg	40 kg	50 kg	60 kg	70 kg	80 kg
Daily quantity	35 g	70 g	117 g	159 g	197 g	233 g	268 g	332 g	392 g	450 g	505 g	558 g
Average duration in days (2 kg bags)	57	29	17	13	10	9	7	6	5	4	4	4
Average duration in days (12 kg bags)	343	171	103	75	61	52	45	36	31	27	24	22

CONVALESCENCE/RESTORATION

Optimal weight of dog	2 kg	5 kg	10 kg	15 kg	20 kg	25 kg	30 kg	40 kg	50 kg	60 kg	70 kg	80 kg
Daily quantity	48 g	96 g	161 g	219 g	271 g	321 g	368 g	456 g	540 g	619 g	694 g	768 g
Average duration in days (2 kg bags)	42	21	12	9	7	6	5	4	4	3	3	3
Average duration in days (12 kg bags)	250	125	75	55	44	37	33	26	22	19	17	16

